

Adulto e idoso

Vacina não é só coisa de criança. A indicação no adulto depende das vacinas que você já recebeu: traga sua caderneta para avaliarmos o que falta.

VACINA	ESQUEMA	PARA QUEM
ROTINA		
Influenza Gripe	1 dose anual	Todos os adultos. A partir de 60 anos, preferir a vacina de alta dose.
dTpa Difteria, tétano e coqueluche	1 dose a cada 10 anos	Todos os adultos. Sem esquema completo para tétano, completar com dT.
Hepatite B	3 doses (0 - 1 - 6 meses)	Quem não foi vacinado.
Hepatite A	2 doses (0 - 6 meses)	Quem não teve a doença nem foi vacinado. Existe a opção combinada A + B.
Tríplice viral Sarampo, caxumba e rubéola	2 doses (0 - 1 mês)	Quem não tem duas doses registradas.
Varicela Catapora	2 doses (0 - 1 mês)	Quem nunca teve catapora nem foi vacinado.
HPV9 ou HPV4	3 doses (0 - 1 a 2 - 6 meses)	Mulheres e homens de 20 a 45 anos. Acima disso, a critério médico.
Febre amarela	2 doses	A SBIm recomenda uma segunda dose 10 anos após a primeira.
Dengue – Qdenga®	2 doses (0 - 3 meses)	Até 60 anos, mesmo para quem nunca teve dengue.
Herpes-zóster Inativada (VZR)	2 doses (0 - 2 meses)	A partir de 50 anos, inclusive quem já teve a doença ou recebeu a vacina atenuada.
Pneumocócica VPC20	Dose única	Idosos e pessoas com doenças crônicas ou outros fatores de risco.
VSR Vírus sincicial respiratório	Dose única	Rotina acima de 70 anos. De 18 a 69 anos, em condições de risco.
EM SITUAÇÕES ESPECIAIS · AVALIAÇÃO MÉDICA		
Meningocócicas ACWY e B	Conforme a vacina e a indicação	Comorbidades, viagens ou risco epidemiológico. Preferir a ACWY à meningocócica C.