

Criança

Sempre que possível, preferimos vacinas combinadas e aplicações na mesma visita: menos picadas e esquema em dia. Dose atrasada deve ser feita na visita seguinte.

VACINA	IDADES DAS DOSES	OBSERVAÇÕES
PRIMEIRO ANO DE VIDA		
BCG Tuberculose	Ao nascer	Dose única, na maternidade ou unidade de saúde. SUS
Hexavalente acelular DTPa · Hib · Pólio inativada · Hepatite B	2, 4 e 6 meses · reforço aos 15–18 meses	A versão acelular causa menos febre e reações. Hepatite B: 1ª dose ao nascer, nas primeiras 12 horas.
Rotavírus pentavalente	2, 4 e 6 meses	Via oral. Primeira dose a partir de 6 semanas de vida.
Pneumocócica VPC20 ou VPC15	2, 4 e 6 meses · reforço aos 12–15 meses	Esquema 3 + 1. Cobre mais sorotipos que a VPC10 do SUS; quem fez VPC10 pode complementar.
Meningocócica ACWY	3 e 5 meses · reforços aos 12–15 meses e aos 5–6 anos	Preferível à meningocócica C por proteger contra quatro sorogrupos.
Meningocócica B	3 e 5 meses · reforço aos 12–15 meses	Pode ser iniciada a partir de 2 meses.
Nirsevimabe Anticorpo contra o VSR	Dose única antes de 12 meses	Mãe não vacinada para VSR, prematuros ou parto menos de 14 dias após a vacina materna. De 12 a 24 meses, se houver risco.
Influenza Gripe	A partir de 6 meses · anual	Na primeira vez, abaixo de 9 anos: 2 doses com 30 dias de intervalo.
Febre amarela	9 meses e 4 anos	Evitar no mesmo dia da tríplice viral antes dos 2 anos (intervalo de 30 dias).
A PARTIR DE 1 ANO		
Tríplice viral + varicela ou tetraviral	12 meses e a partir de 15 meses	Sarampo, caxumba, rubéola e catapora. Intervalo de 3 meses entre as doses.
Hepatite A	2 doses a partir de 12 meses	Intervalo de 6 meses entre as doses.
Reforços de tríplice bacteriana	4–6 anos (DTPa–VIP) · 9–11 anos (dTpa)	O reforço dos 4–6 anos inclui a pólio inativada.
Dengue – Qdenga®	A partir de 4 anos · 2 doses (0 - 3 meses)	Indicada mesmo para quem nunca teve dengue.
HPV9 Papilomavírus humano	A partir de 9 anos · 2 doses (0 - 6 meses)	Meninas e meninos. Protege contra 9 tipos de HPV; quem fez HPV4 pode ser revacinado.