

Gestante

Vacinar na gravidez protege a mãe e transfere anticorpos ao bebê, que fica protegido nos primeiros meses de vida, antes de poder receber as próprias vacinas.

VACINA	ESQUEMA	OBSERVAÇÕES
RECOMENDADAS PARA TODAS AS GESTANTES		
dTpa Difteria, tétano e coqueluche	1 dose a partir de 20 semanas, em toda gestação	Esquema anterior incompleto: completar com dT (intervalo mínimo de 1 mês). Se não aplicada na gestação, fazer no puerpério o quanto antes.
Influenza Gripe	1 dose anual, em qualquer trimestre	A gestante é grupo de risco para complicações da gripe. Disponível nas versões trivalente e tetravalente.
VSR – Abrysvo® Vírus sincicial respiratório	1 dose a partir de 28 semanas, em toda gestação	Protege o bebê contra bronquiolite. Sem limite superior de idade gestacional e em qualquer época do ano. Entre 24 e 27 semanas, a critério médico.
Hepatite B	3 doses (0 - 1 - 6 meses)	Para gestantes não vacinadas anteriormente. SUS
Covid-19	Dose única a cada gestação	Pode ser aplicada em qualquer momento da gravidez. SUS
EM SITUAÇÕES ESPECIAIS · AVALIAÇÃO MÉDICA		
Hepatite A	2 doses (0 - 6 meses)	Vacina inativada, sem risco teórico para mãe e feto. Considerar pelo risco de exposição no Brasil.
Hepatite A e B Combinada	3 doses (0 - 1 - 6 meses)	Opção que substitui as vacinas isoladas das hepatites A e B.
Pneumocócica VPC20	Dose única	Gestantes com risco aumentado para doença pneumocócica invasiva.
Meningocócica ACWY	1 dose	Conforme situação epidemiológica ou comorbidades de risco.
Meningocócica B	2 doses (intervalo mínimo de 1 mês)	Conforme situação epidemiológica ou alto risco para doença meningocócica.
Febre amarela	Somente se indicada	Normalmente contraindicada. Aplicar apenas quando o risco da doença superar o da vacinação.

NÃO APLICAR DURANTE A GESTAÇÃO

Tríplice viral, HPV e varicela podem ser feitas no pós-parto, inclusive durante a amamentação. Dengue é contraindicada também durante a amamentação.